

SIDA CRECE UN 15% ANUAL EN CHILE

...
Las nuevas terapias permiten que las personas infectadas tengan una sobrevivencia igual que si estuvieran sano. El sector público y privado ofrece una cobertura de 90% para tratamientos, cuyos valores mensuales están entre \$100 mil y \$800 mil.



En Chile hay unas 22 mil personas con SIDA y test positivo. El infectólogo y jefe del departamento de Medicina Interna de Clínica Alemana, doctor Luis Miguel Noriega,

explica que las campañas en el país han sido débiles. Sin embargo, en lo que respecta a atención, sostiene que hay un nivel de organización relativamente adecuado y una buena cobertura para las terapias.

Pero si la persona no sabe que es positiva, no podrá prevenir la transmisión a otros, y no comenzará a tiempo las terapias para evitar enfermarse.

Hay disponibilidad de terapia y cobertura en el sector público y privado, pero poca difusión de campañas de prevención y realización de test de diagnóstico, por lo que el especialista enfatiza que en este momento el mensaje más importante a transmitir es que hay que hacerse los test.

Noriega explica que los tratamientos corresponden a procesos con drogas que atacan distintas etapas de la integración del virus a las células del ser humano. En este momento la pastilla puede contener una, dos o tres drogas, que han ido mejorando en las características farmacológicas. Se pueden tomar con mucha frecuencia, incluso una vez al día. Las terapias son de por vida y los costos varían desde \$100 mil a \$800 mil mensuales y hay cobertura tanto de Fonasa como de las Isapres, que permiten subsidiar aproximadamente el 90% del costo de los medicamentos.

CONTAGIO

El médico explica que la vía de transmisión del virus es mayoritariamente sexual, prácticamente el 99%, ya que el contagio por problemas de drogadicción (vía endovenosa) en Chile es muy bajo, así como también la transmisión vertical o de la madre al hijo.

Precisa que el 80% de los contagios a través de esta vía sexual corresponde a relaciones homo o bisexuales, mientras que el 20% ocurre en relaciones heterosexuales.

El aumento del número de casos en Chile ha sido de aproximadamente un 15% anual en los últimos 8 años y probablemente seguirá al mismo ritmo en los próximos años, salvo que aparezcan medidas significativas de control y educación en la población, señala el facultativo. El periodo más riesgoso de contagio es entre los 15 y 50 años, rango en el que también se encuentra la mayoría de los infectados.

La mortalidad de esta enfermedad es actualmente bajísima si es tratada adecuadamente.

Una persona infectada que es detectada con anticipación y comienza un tratamiento a tiempo, tiene una probabilidad de sobrevivir similar a una que no está infectada.

El médico recomienda que toda persona que se encuentre en edad sexual activa se haga el examen. Y que lo repita después de cada actividad sexual de riesgo para certificar que es negativo.

Estrategia, diciembre de 2010